



**Opis**

Klobuk može biti od 3 do 7 centimetara širok, dok visok može biti i preko 15 centimetara. Kod mladih primjeraka, klobuk je elipsoidno izduljen. U starijih primjeraka, klobuk poprima oblik zvona. Inače je cijela gljiva bijele boje, dok stariji primjerci na pojedinim dijelovima mogu biti blago smeđe boje. Stručak je valjkast i upalj, te na dnu blago zadebljan. Listi su vrlo gusti te su u ranoj dobi bijele boje, a kasnije tamne i pretvaraju se u tekućinu nalik na tintu. Otisak spora je crne boje.

**Kemijske reakcije**

Donji dijelovi kore struča s gvajakolom daju plavkasto zelenu boju, dok meso struča poprima zlatno žutu boju u reakciji s eljezovim sulfatom.

**Stanište**

Relativno rjeđa vrsta koja raste po travnatim površinama, pogotovo ako su nagnjene. Može izrasti i u naseljima, uz puteve, na gnoju, u parkovima, uz rijeke. Uspijeva u raznim vrstama vegetacije. Ova vrsta se prvenstveno može naći u Europi, Sjevernoj Americi i Australiji.

**Doba**

Ova gljiva raste u proljeće, od četvrtog do šestog mjeseca, te nakon toga ponovno u jesen, od devetog do dvanaestog mjeseca.

**Jestivost**

Vrlo cijenjena i ukusna gljiva. Bitno je napomenuti da se za jelo prvenstveno koriste primjerci koji nisu potamnili, pa čak niti poželjni tamniti (u početnoj fazi, prvo se pojavi crvenkasta boja).

**Slične vrste**

normal;">Gotovo da i ne postoji mogućnost da se ova gljiva zamijeni nekom otrovnom vrstom. Eventualno je moguća zamjena sa nekom od drugih gljiva iz roda Coprinus, kod kojih u pravilu u početnim fazama propadanja, listi?i ne poprimaju crvenu boju.</span></p> <p style="display: inline !important;"><span style="font-weight: normal;"><br /></span></p> </strong> <p>◆</p> </strong></p> <p>◆</p>