



**Opis**

Klobuk plamenke je širok obino od 5 do 10 centimetara, te je zlatno žute boje sa blagom primjesom crvene, te je pokriven crvenkastim ljuskicama koje kasnije nestaju. Klobuk je u mladosti konveksan dok se kasnije potpuno otvara. Prilikom koje je ljepljiv i sjajan. Stručak je sližne boje kao i klobuk, te je prema dnu malo odebljan i izdužen. Na stručku je obino karakterističan prsten. Listiže ove vrste su gusti te svijetlo smeđe boje. Otisak spora je narađasto smeži.

**Kemijske reakcije**

U reakciji s kalijevim hidroksidom stvara se crveno obojenje.

**Stanište**

Prvenstveno raste na panjevima ili pri dnu živog drveća, obino [hrastova](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-oak.php?lang=hrv "hrast"), ali i drugih vrsta bjelogorice. Rasprostranjena je po gotovo svim kontinentima.

**Doba**

Plamenka se mođe naži prvenstveno tijekom jeseni, iako u pojedinim krajevima raste i tijekom ljeta.

**Jestivost**

Otrovna. Primjerci sakupljeni u pojedinim dijelovima Sjeverne Amerike pokazuju halucinogena svojstva, dok za gljive sakupljene u drugim područjima nema mnogo podataka.

**Sližne vrste**

Eventualno se mođe zamijeniti sa drugim vrstama iz istog roda, dok se u crnogorižnim žumama mogu sresti pojedine vrste roda *Pholiota* koje su sližne plamenci. Ni jedna od navedenih gljiva nije jestiva.