



**Opis**

Klobuk grabovog vrganja može biti od 3 do 10 centimetara širok te je u mladosti polukružan dok je u starosti otvoren. Boja kape može se kretati od žućkasto smeđe pa do tamno sive. Stručak je relativno visok, obično od 8 do 15 centimetara, te po sebi ima crne pjegice. Stručak inače na dodir pocrni. Pore su prilično duge te su bijele boje, ili eventualno sive. Otisak spora je smeđe boje.

**Kemijske reakcije**

Meso reagira s kalijevim hidroksidom stvarajući narančasto smeđe obojenje. U reakciji s gvajakolom, meso postaje plavkasto sive boje.

**Stanište**

Relativno rjeđa vrsta, te najčešće raste uz grabove, ali se može naći i uz

[hrastove](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-oak.php?lang=hrv), [kesten](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-chestnut.php?lang=hrv) i [topola](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-poplar.php?lang=hrv). Ova vrsta je prvenstveno poznata na području Europe.

**Doba**

Ova vrsta raste prvenstveno izmeđustog i desetog mjeseca.

**Jestivost**

Jestiva i vrlo kvalitetna gljiva. Kod starijih primjeraka stručak može biti relativno tvrd, tako da se kod takvih primjeraka treba stručak

odbaciti.

**Sli?ne vrste**

**Gotovo sve gljive s kojima bi se ova vrsta i mogla zamijeniti su jestive i gotovo jednake kvalitete, tako da nema opasnosti od zamjene s otrovnim vrstama. U ve?ini tih vrsta, meso ne tamni tako brzo i intenzivno kao kod grabovog vrganja.**